

Précautions générales

1. Gardez Opalescence hors de la portée des enfants.
2. N'avez pas le gel ni même pendant le rinçage. Le produit contient du peroxyde et possiblement du fluorure; peut être nocif en cas d'ingestion de grandes quantités.
3. Un faible pourcentage de patients souffrant de sensibilité lors d'un traitement de blanchiment.
4. Les aliments et jus à forte acidité peuvent causer une sensibilité dentaire.
5. Certains patients ont eu de l'inconfort temporaire au niveau des gencives, des lèvres ou de la langue. Appelez votre dentiste si les symptômes persistent plus de deux jours ou s'aggravent. Ces effets secondaires disparaissent habituellement dans les deux à trois jours suivant l'arrêt du traitement.
6. Au fil du temps, le café, le tabac et d'autres produits peuvent tacher de nouveau les dents. Le cas échéant, utilisez Opalescence pendant quelques nuits pour retrouver la blancheur de vos dents.
7. Il est important de faire régulièrement des examens et des nettoyages, avant et après le traitement, pour conserver un sourire d'apparence saine.
8. Il est normal que certains amalgames ou des plombages argent tachent la gouttière de blanchiment d'une couleur mauve foncé.
9. Les couronnes, ponts, prothèses partielles, facettes et plombages ne blanchissent pas.
10. Conservez le gel de blanchiment à l'abri de la chaleur ou de la lumière directe. La réfrigération est recommandée. Ne pas congeler.
11. Mettre au rebut les quantités de gel de blanchiment inutilisées une fois le traitement est terminé.



1-800-265-3444 | www.clinicalresearchdental.com

Commencez à blanchir votre sourire dès aujourd'hui



Opalescence^{MD}
systèmes de blanchiment des dents

Précautions à prendre pour le blanchiment

1. N'utilisez pas de l'eau de javel pour blanchir vos dents.
2. Les femmes enceintes ne devraient pas blanchir leurs dents.
3. Si vous avez des questions quant à l'utilisation adéquate de ce produit, notamment à savoir la durée nécessaire pour le blanchiment, veuillez consulter votre dentiste le plus rapidement possible.
4. Ne faites pas l'usage de produits du tabac et ne mangez pas durant le blanchiment.
5. Les taches blanches qui peuvent apparaître sur l'émail au cours du blanchiment peuvent se marier avec un traitement de blanchiment continu.
6. Les dents sont naturellement plus foncées au long de la ligne gingivale - ces endroits nécessiteront une période de blanchiment plus longue et resteront légèrement plus foncées.

Directives particulières


Opalescence®




Suivez les directives de votre dentiste pour savoir comment appliquer le gel dans votre gouttière de blanchiment faite sur mesure - il suffit d'utiliser un tiers ou de la moitié de la seringue.



Nettoyez vos dents avant d'insérer la gouttière. Tapotez légèrement sur la gouttière pour une meilleure adhésion aux dents. Sauf indication contraire de votre dentiste, utilisez Opalescence à 10 % pendant 8 à 10 heures ou toute la nuit, Opalescence à 15 % : 4 à 6 heures, Opalescence 20 % : 2 à 4 heures et Opalescence 35 % : 30 minutes.



Retirez le gel excédent avec un doigt propre ou une brosse à dents souple. Rincez deux fois; n'avalez pas le gel pendant le rinçage. Si une sensibilité considérable se produit, cessez le traitement et consultez votre dentiste.



Après le blanchiment, nettoyez la gouttière à l'eau froide à l'aide d'une brosse à dents souple et rangez-la dans l'étui prévu à cet effet.